



BRAMBORY - výsledky pokusů s přípravky Trisol v letech 2004 až 2007.



1. APLIKACE – PŘI VZCHÁZENÍ, TVORBĚ LISTŮ AŽ DO FÁZE BBCH 40 TRISOL AKTIVÁTOR - doporučujeme 2 l/ha.

Tvorba výnosu: tvorba výnosu zvýšením počtu středních hlíz na rostlině vhodné pro pěstitele sadby a konzumních brambor pro balíčkování

Účinky: Razantní tvorba kořenů a kořenového vlášení, zvýšení příjmu živin rostlinami, prodloužení růstu stolonů, zlepšení zdravotního stavu.

BRAMBORY

2. APLIKACE – OD POČÁTKU TVORBY HLÍZ TRISOL FOLIAR – doporuč. 1 l/ha

Tvorba výnosu: tvorba výnosu probíhá zvětšením velikosti hlíz
razantní zvýšení podílu střední velikosti hlíz
zvýšení obsahu škrobu až o 2%
výhodné pro pěstitele průmyslových a škrobářenských odrůd brambor

Účinky: Green efekt, zvětšení listové plochy, zlepšení zdravotního stavu, mírné prodloužení vegetace.



Polní den Havlíčkova Borová – vpředu porost ošetřený Trisoly



KOMBINACE OBOU VÝŠE UVEDENÝCH APLIKACÍ – TERMÍNY DLE APLIKACE 1 a 2. doporučujeme TRISOL AKTIVÁTOR 2 l/ha. + TRISOL FOLIAR 1 l/ha


Tvorba výnosu: tvorba výnosu probíhá současným zvětšením velikosti hlíz a zvýšením jejich počtu na rostlině
výrazně se zvyšuje podíl střední velikosti hlíz
výhodné pro pěstitele konzumních brambor

Účinky: Kombinace obou výše uvedených aplikací



4 leté výsledky s přípravky TRISOL v bramborách při průměrné výnosové hladině KONTROLY
44 t/ha

P.S. Lukavec ve spol. s VURV Ruzyně



Ovlivnění výtěžnosti škrobu u brambor po aplikaci Trisolů.

