

KUKUŘICE sumární pokusy s TRISOLY v roce 2006 až 2007.

1. APLIKACE – OD 3 LISTŮ DO FÁZE BBCH 18 (výška 24 cm)

TRISOL AKTIVÁTOR – doporučujeme 2 l/ha.

Tvorba výnosu:
omezení redukci zrn v palici
zvýšení výnosu zelené hmoty
zvýšení obsahu sušiny

Účinky: Razantní tvorba kořenů a kořenového vlášení, zvýšení příjmu živin rostlinami, zlepšení zdravotního stavu.


2. APLIKACE – OD VÝŠKY POROSTU 45 cm PO DOBU RŮSTU

TRISOL FOLIAR – doporučujeme 1 l/ha

Tvorba výnosu:
zvýšením HTS
zvýšením obsahu sušiny

Účinky: Green efekt, zvětšení listové plochy, zlepšení zdravotního stavu, mírné prodloužení vegetace.

2006




V průměru bývá dosahováno po aplikaci Trisolu Aktivátor 13% navýšení zelené hmoty a 6% zvýšení výtěžnosti zrna. Pokud je chladné jaro, nemá smysl stimulaci až na výjimečné případy aplikovat. Kukuřice je teplomilná rostlina a počká si s aktivním růstem na teplo. Je zřejmé, že aplikace nově připravovaného přípravku Trisol Foliar a jeho současného předchůdce Trisolu List Mikro v období 45 cm výšky porostu, bude významným intenzifikačním faktorem. Je zřejmé, že pozdější aplikace než ve 45 cm výšky porostu, by přinesla ještě větší a jistější navýšení výnosu, zde jsme ale limitováni technikou a obvyklou agrotechnikou podniků. Z tohoto důvodu je doporučení termínu aplikace ve 45 cm výšce porostu přípravku Trisol Foliar kompromisem doporučení vhodného termínu aplikace.



KUKUŘICE pokusy 2007

P.S. Lukavec ve spol. s VURV Ruzyně kukuřice na siláž
LG 2275, výnos zelené hmoty v t/ha a obsah sušiny v %



Modelové výsledky z P.S.Lukavec ve spol. s VURV Ruzyně +
provozní pokusy při výnosové hladině KONTROLY 50 t/ha zelené
hmoty

